

MARPE Verwijsprotocol

Voor tandartsen en logopedisten — niet-chirurgische verbreding van de bovenkaak bij volwassenen.

Wanneer verwijzen

- Vermoeden van transversale maxillaire deficiëntie bij een volwassene.
- Mondademhaling, snurken of onrustige slaap in combinatie met een smalle bovenkaak.
- Crowding waarbij transversale ruimtewinst gewenst is.
- Vraag om beoordeling van de suturmaturatie (CBCT, Angelieri-stadium A–E).

Geschiktheidscriteria (indicatief)

- 16 jaar of ouder met bevestigde transversale discrepantie.
- Suturmaturatie stadium A, B of C (D/E verlaagt de slagingskans sterk).
- Minimaal ~3 mm corticaal palatumbot voor schroefverankering.
- Geen actieve parodontitis; realistische verwachtingen; bereid tot 9–12 maanden retentie.
- Voor OSA-indicatie: bevestigde diagnose via polysomnografie, BMI bij voorkeur < 30.

Mee te sturen gegevens

Verwijzer	Naam, beroep, e-mail, (optioneel) BIG-nummer
Patiënt	Initialen (geen volledige naam), leeftijd
Klacht	Korte samenvatting van klacht en relevante bevindingen
Beeldvorming	Indien beschikbaar: CBCT / panoramische opname (optioneel)

Verwijzen

Verwijs digitaal via het verwijsformulier op marpe.mondzorgsloterweg.nl/verwijzers, of neem contact op via info@mondzorgsloterweg.nl. We koppelen terug over de vervolgstappen.

Dit protocol is informatief. MARPE is niet voor iedereen geschikt; een definitieve beoordeling vereist klinisch onderzoek en beeldvorming. SARPE blijft de gouden standaard bij een gefuseerde sutuur. Mondzorg Sloterweg – Drs. Farbod Sharifi.